УНИФИЦИРОВАННАЯ

2010 г.
Таблица VII, лист 2

СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА КАМЕННОУГОЛЬНЫХ (СРЕДНЕ-ВЕРХНЕ)ОТЛОЖЕНИЙ БЕЛАРУСИ

Международная стратиграфическая шкала 2004 | Общая стратиграфическая шкала (Постановления МСК...2003) | Биозональные стандарты (Постановления МСК...2003; Зональная стратигр...2008) | Региональные стратиграфические подразделения | Палеонтологическая характеристика | Корреляция местных стратиграфических разрезов | Стратиграфические схемы смежных регионов

Система | Подсистема | Отдел | Ярус | Подъярус | Горизонт | Аммоноидеи | Фораминиферы | Надгоризонт, горизонт | Слои | Зона, лона по миоспорам | Миоспоры | Брахиоподы | Остракоды | Фораминиферы | Другие группы органических остатков

Северный борт Люблинско-Львовского прогиба | Юго-западный район | Юго-восточный район | Восточно-Европейская (как платформа) (Решение...1990) | Московская синеклиза (за западным и северным крылом) (Решение...1990) | Днепровско-Донецкий прогиб (Решение...1990; Стратиграфические схемы...1993) | Донбасс (Решение...1990; Стратиграфические схемы...1993) | Львовско-Люблинский прогиб (Решение...1990) | Западная Европа (Решение...1990; Стратигр. кодекс...2006) | Подъярус

Система: Каменноугольная; Подсистема: Верхняя; Отдел: Средний; Ярус: Гжельский 299,0; Касимовский 303,9 | Подсистема: Нижняя; Отдел: Московский; Ярус: Гжельский; Касимовский 306,5; Отдел: Башкирский; Ярус: Мячковский; Подольский; Каширский; Верейский 311,7; Отдел: Серпуховский; Ярус: Алексинский; Михайловский; Серпуховский 318,1

Аммоноидеи: Shumardites - Vidrioceras; Dunbarites - Pla-nohumantites; Pseudoparalegoceras - Wellerites; Diabloceras - Winslowceras; Paralegoceras - Eowellerites; Diabloceras - Axinolobus; Branneroceras - Gastroceras; Bilingites - Cancelloceras; Reticuloceras - Bashkirtsevites; Homoceras - Hudsonoceras

Фораминиферы: Daixina bradyformis - Globifusulina robusta; Daixina sokensis; Jigulites jigulensis; Rauserites rossicus - R. stuckenbergi; Rauserites quasiarcticus; Montiparus montiparus; Protriticites pseudomonumentum - Obsoletes obsoletus; Fusulina cylindrica - Protriticites ovatus; Fusulinella bocki; Fusulinella colaniae - F. vozhgalensis - Beedeina kamensis; Fusulinella subpulchra; Fusulinella primitiva - Pseudofusulinella gorsky; Ajjulotvella ajjulotvica; Schubertella sp.; Novella evoluta var. Moscovia Raus., Eostaffella acuta Grozd. et Leb., Endothyranella protracta Raus.

Брахиоподы: Eoreticularia tamarovki Fisch., Eomarginifera timanica Tschern., Chonetites ex gr. mosquensis Fisch.; Lingula sp.; Listovaia флора: Neoplectra aff. tenuifolia (Schloth.)

Остракоды: Fusulinella ex gr. bocki Moell., Hemifusulina ex gr. bocki Moell., Schubertella rigoviciensis Raus., Sch. aff. infiata Raus., Sch. obscura var. compressa Raus., Fusiella typica Lee et Chen, Profusulinella ex gr. librovitch (Dutk.), Ozawainella angulata (Col.), Pseudostaffella sphaeroidea Ehrenb.

Фораминиферы: Fusulinella ex gr. bocki Moell., Hemifusulina ex gr. bocki Moell., Schubertella rigoviciensis Raus., Sch. aff. infiata Raus., Sch. obscura var. compressa Raus., Fusiella typica Lee et Chen, Profusulinella ex gr. librovitch (Dutk.), Ozawainella angulata (Col.), Pseudostaffella sphaeroidea Ehrenb.; Ajjulotvella saratovica (Put. et Leont.), A. ajjulotvica Raus., Profusulinella ovata Raus., P. prisca var. timanica Kir., P. arte var. kamensis Saf., Ozawainella parathorobidoides Man., Pseudostaffella gorsky (Dutk.), Ph. ivanovi Raus., Novella evolutа var. Moscovia Raus., Eostaffella acuta Grozd. et Leb., Endothyranella protracta Raus.

Другие группы органических остатков: Листовая флора: Neoplectra aff. tenuifolia (Schloth.); Кринкоиды; Водоросли: Donezella sp.; Конодонты: Idiognathodus sinuatus (Harr. et Hol.), Id. corrugatus (Harr. et Hol.), Streptognathodus parvus Dunn, Spathognathodus minutus (Ellison), Adetognathodus spathus (Dunn), Gondolella cf. dexra Kozeanko; Двустворки: Myalina moronesis Varthen, Dannbella speciosa (Jack.), D. pagiraiae (Sow.); Мшанки: Fenestella cf. veneris Fisch.; Двустворки: Carboniola cf. aquilina (Sow.), C. cf. jirasquilina Schulp.; Цефалоподы: Goniatites cf. orientalis Librovitch; Водоросли: Donezella ex gr. lutugini Mast.

Корреляция местных стратиграфических разрезов:

Юго-западный район: 1 - западная зона (Первомайская синеклиза, Горловская синеклиза, западная окраина Бугворинско-Великоберезкинского, Шестаевско-Сосоховской ступени и Летовского погребенного выступа); 2-северная зона (Прибужинская, Предприазовская синеклизы и южные участки Северо-Бугатского плеча); 3 - центральная зона (Прикаспийская, Прикаспийско-побережная, Южно-Бугатская, Прикаспийско-Северо-Кенгинская, Северо-Шестаевская, Предугатская, Предприазовская синеклизы); 4 - южная зона (Северо-Ельская, Южно-Ельская синеклизы)

Юго-восточный район: Ia. Брагинско-Ловская седловина; IIa. Северо-Придонецкая моноклиналь

Стратиграфические схемы смежных регионов: Восточно-Европейская (как платформа) (Решение...1990); Московская синеклиза (за западным и северным крыльями) (Решение...1990); Днепровско-Донецкий прогиб (Решение...1990; Стратиграфические схемы...1993); Донбасс (Решение...1990; Стратиграфические схемы...1993); Львовско-Люблинский прогиб (Решение...1990); Западная Европа (Решение...1990; Стратигр. кодекс...2006)

Подъярус: нижн. отдел; C; B; A; D; C; B; A; B; A; C; B; A

Подстилающие отложения

Утверждена Приказом Департамента по геологии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 49 от 22.09.2010 г.